

Avant la vaccination

Problème physique, psychique ou cognitif :

- Chimiothérapie
- Anxiété, stress
- Lymphœdème...

Eligibilité du patient

Majeur avec bon Assurance Maladie

Majeur sans bon Assurance Maladie répondant aux critères :

- Femme enceinte
- Personne à IMC > 40
- Entourage bébé < 6 mois à facteurs de risque de grippe grave (FAQ Annexe1)

OUI

NON

Pas de vaccination en officine

Vérification des contre-indications

- Allergie protéines de l'œuf et du poulet
- Réaction à une précédente vaccination
- Hypersensibilité à néomycine, gentamycine, formaldéhyde

Médecin traitant

Fièvre, maladie aiguë

Reporter la vaccination

Médecin traitant

Information des potentiels effets indésirables

- Douleur, gonflement, induration au point d'injection
- Céphalées, myalgies
- Fièvre, malaise, frissons
- Effets rares : choc allergique, rash, érythème

Recueil du consentement du patient : *Formulaire*

NON

Pas de vaccination en officine

OUI

Préparation à l'injection

- Gants (non obligatoire mais recommandé)
- Compresses stériles + antiseptique
- Pansement
- Boîte de recueil DASRI
- Trousse de secours
- Vaccin à température ambiante
- Lavage des mains



L'injection

- Position assise de la personne
- Repérage de la zone d'injection
- Désinfection avec temps de contact et séchage du produit adapté

- Absence de problème cutané au point d'injection : cicatrice, inflammation, démangeaisons, douleur...
- Personne avec tatouage : ne pas piquer dans l'encre
- Personne avec curage axillaire : vacciner côté opposé

Personne sous anticoagulants

OUI

Injection SC

NON

Injection IM

- Recueil de la goutte de sang avec la compresse
- Application du pansement
- Pas de recapuchonnage de l'aiguille
- Elimination des déchets dans la boîte DASRI

Après l'injection

Surveillance du patient

- Absence de réaction
- Survenue d'un malaise vagal ou choc anaphylactique : conduite à tenir spécifique
- Autres problèmes → Consultation médicale



Conseils au patient

- Réactions locales type œdème, rougeur, induration → application de froid et prise d'un antalgique simple (paracétamol sauf contre-indication)
- Extension rapide ou douleur importante → orientation vers consultation médicale



Traçabilité

- Inscription sur DMP ou carnet de vaccination ou remise attestation (FAQ Annexe 5)
- Enregistrement sur un registre à la pharmacie (FAQ Annexe 4)
- Transmission au médecin traitant par messagerie sécurisée

Tarifcation du vaccin et de l'injection