

VARIOLE DU SINGE MONKEYPOX :

où se faire vacciner ?



CeGIDD* du CHU de Dijon
10 Boulevard Maréchal de Lattre
de Tassigny à Dijon
Rendez-vous au 03 80 28 14 63



CeGIDD* Doubs-Jura,
Association d'hygiène sociale
15 Avenue Denfert Rochereau
à Besançon
Rendez-vous par mail
(vaccination.monkeypox@ahs-fc.fr)
avec nom, prénom, adresse
et numéro de téléphone



CeGIDD* Lons-le Saunier,
Association d'hygiène sociale,
Centre hospitalier Jura Sud
55 rue du Dr Michel à Lons-le-Saunier
Rendez-vous au 03 84 35 62 06



**CeGIDD* du Conseil Départemental
de la Nièvre, Service Santé-
Prévention, Centre de vaccination**
3 bis rue Lamartine à Nevers
Rendez-vous au 0800 580 000



CeGIDD* Vesoul, Groupe hospitalier
2, Rue Heymès à Vesoul
(RDC, porte 6, salle d'attente B)
Rendez-vous au 03 84 96 61 23



CeGIDD* Mâcon, Centre hospitalier
350 Bd Louis Escande, à Mâcon
Rendez-vous au 03 85 27 72 39
ou 03 85 27 53 03



CeGIDD* Chalon-sur-Saône,
Centre hospitalier William Morey
4 Rue du Capitaine Drillien
à Chalon-sur-Saône
Rendez-vous au 03 85 91 00 57
ou 03 85 91 00 52



CeGIDD* Auxerre, Centre hospitalier,
Service de santé publique Yonne Sud
2 Boulevard de Verdun à Auxerre
Rendez-vous au 03 86 48 48 62



**CeGIDD* Sens, Service de Santé
Publique, Site Saint Jean**
7 boulevard Maréchal Foch à Sens
Rendez-vous au 03 86 86 18 89



**CeGIDD* 90 - Centre de Prévention
et d'Education Familiale Simone Veil**
14 B rue des Entrepreneurs à Belfort
Rendez-vous au 03 84 28 17 12

* CeGIDD : centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH,
des hépatites et des infections sexuellement transmissibles



VARIOLE DU SINGE MONKEYPOX

0801 90 80 69

appel gratuit
depuis un poste fixe,
de 8h à 23h 7j/7



Personnes concernées pour la vaccination

- Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes trans, dans les deux cas, multipartenaires
- Les travailleurs-travailleuses du sexe (prostitution/escorting)
- Les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle
- La vaccination peut aussi être envisagée au cas par cas pour les professionnels de santé amenés à prendre en charge les malades.

Transmission du virus

- Le virus monkeypox peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade, ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons...).
On peut également se contaminer au contact de l'environnement du malade (litterie, vêtements, vaisselle, linge de bain...).
- En Afrique centrale ou de l'ouest l'homme peut aussi s'infecter au contact d'animaux, sauvages ou en captivité, morts ou vivants, tels que les rongeurs, ou les singes.
- L'infection par le virus MKP n'est pas connue comme une infection sexuellement transmissible (IST), mais le contact direct avec une peau lésée durant un rapport sexuel facilite la transmission.

Le respect de mesures d'hygiène et de prévention simples permet d'éviter la transmission et de se protéger efficacement du virus, y compris après avoir été vacciné.

