


LA PRESCRIPTION



La prescription devra comporter l'ensemble des éléments ci-dessous (ordonnance sécurisée établies en toutes lettres pour les prescriptions de stupéfiants et assimilés, exécutées en ville) :

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nom du médicament en DCI, dosage (en mg/ml) ▪ Mode d'administration (PCA) |  | <p>Si voie IV préciser sur quel « support » (chambre implantable, cathéter PICC Line...)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voie d'administration (SC, IV...) ▪ Débit de perfusion continu (en mg/h)
ou dose totale par 24h (en mg/24h) |  | <p>Selon la molécule choisie et la voie d'administration. Peut-être diminuée pour éviter l'administration d'un bolus trop important et éviter de provoquer un effet "shoot".</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dose de chaque bolus (en mg) ▪ Période réfractaire entre deux bolus (en min) |  | <p>Notamment si relais d'un traitement per os ou par patch</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nombre de bolus/h selon les modèles de pompe ▪ Date et Heure de début de traitement ▪ Durée du traitement, date de réévaluation | | |

Morphine injectable PSE ou PCA (IV ou SC) vers une morphine orale LP



Morphine per os LP vers morphinique injectable PCA ou PSE (IV ou SC)




Table pratique d'équianalgésie des opioïdes forts dans la douleur cancéreuse par excès de nociception (ratio calculé à partir du passage par la morphine orale)

Version 9 - Octobre 2016
Fédération soins de support - soins palliatifs - CHU de Grenoble-Alpes (38)
coordinationsupport@chu-grenoble.fr - soinspalliatifs@chu-grenoble.fr

Morphine en mg				Oxycodone en mg						Hydromorphone en mg		Fentanyl en µg				
PO		SC		IV		PO		SC - IV		PO		Transdermique	Transmuqueux			
Dose / 24h	Dose du bolus**	Dose par 24 heures		Dose du bolus**		Dose / 24h	Dose du bolus**		Dose du bolus**		Dose / 24h	Dose / 72h	Dose du bolus			
Moscotin cp LP	Actiskénan gel LI 5 - 10 - 20 - 30 mg	Morphine sol inj amp 1 - 10 - 20 50 - 100 - 200 400 - 500 mg		Morphine sol inj amp 1 - 10 - 20 50 - 100 - 200 400 - 500 mg		OxyContin cp LP 5 - 10 - 15 - 20 30 - 40 - 60 - 80 120 mg	OxyNorm gel LI 5 - 10 - 20 mg OxyNormDRO cp orodispersible LI 5 - 10 - 20 mg OxyNorm solution buvable 10 mg/ml		OxyNorm sol inj amp 10 - 20 50 - 200 mg		Sophidone gel LP 4 - 8 - 16 - 24 mg	Duragesic Fentanyl Ratiopharm Fentanyl Sandoz Fentanyl Winthrop Matrifen patch 12 - 25 - 50 75 - 100 µg/h	Abstral cp sublingual 100 - 200 - 300 - 400 - 600 - 800 µg	Actiq appl. buccale 200 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 1600 µg		
Skénan gel LP 10 - 30 - 60 100 - 200 mg	Sévedol cp LI 10 - 20 mg Oramorph sol buv unidose LI 10 - 30 - 100 mg/5ml											Breakly film orodispersible 200 - 400 - 600 800 - 1200 µg	Effentora cp gingival 100 - 200 - 400 - 600 - 800 µg			
	1/10 1/6	1/10 1/6	1/10 1/6	1/10 1/6	1/10 1/6		1/10 1/6	1/10 1/6	1/10 1/6							
20	2	3,5	10	1	1,5	6,5	0,5	1	10	1	1,5	6,5	0,5	1		
30	3	5	15	1,5	2,5	10	1	1,5	15	1,5	2,5	10	1	1,5		
60	6	10	30	3	5	20	2	3	30	3	5	20	2	3	8	25
90	9	15	45	4,5	7,5	30	3	5	45	4,5	7,5	30	3	5		37
120	12	20	60	6	10	40	4	7	60	6	10	40	4	7	16	50
160	16	27	80	8	13	53	5	9	80	8	13	53	5	9		
180	18	30	90	9	15	60	6	10	90	9	15	60	6	10	24	75
200	20	33	100	10	17	67	7	11	100	10	17	67	7	11		
240	24	40	120	12	20	80	8	13	120	12	20	80	8	13	32	100
280	28	47	140	14	23	93	9	16	140	14	23	93	9	16		
300	30	50	150	15	25	100	10	17	150	15	25	100	10	17	40	125
360	36	60	180	18	30	120	12	20	180	18	30	120	12	20	48	150
400	40	67	200	20	33	133	13	22	200	20	33	133	13	22		
480	48	80	240	24	40	160	16	27	240	24	40	160	16	27	64	200
540	54	90	270	27	45	180	18	30	270	27	45	180	18	30	72	225
600	60	100	300	30	50	200	20	33	300	30	50	200	20	33	80	250
720	72	120	360	36	60	240	24	40	360	36	60	240	24	40	96	300
900	90	150	450	45	75	300	30	50	450	45	75	300	30	50	120	375
1000	100	167	500	50	83	333	33	56	500	50	83	333	33	56		412

** Dose du supplément = 1/6 à 1/10 de la dose totale par 24 heures par le même voie. LP = Libération prolongée = durée d'action 12 h. LI = Libération immédiate = durée d'action 4 à 6 h.

Exemple de tableau d'équianalgésie

Source : Société Française d'Accompagnement et de Soins